

О рекомендациях, куда обращаться в случае присасывания клещей

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

КЛ

КАК МОЖНО ЗАРА



КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ

КАК ОДЕВАТЬСЯ В ЛЕС

Голову и шею
закрывают
головным убором,
лучше капюшоном

Используйте
светлую
одежду

Рукава
должны быть
длинными



19.05.2021 г.

Как снять клеща

Лучше всего это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства, где клещ сильно укрепляется на весь период присасывания.

При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к месту присасывания, избегая области головы
- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, 0,05% повидон-йод)
- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом
- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать 5% йодом и оставить на 15 минут

Куда можно сдать клеща на исследование

Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию.

Снятые клещи исследуются:

1. Методом ИФА - антиген вируса клещевого энцефалита
2. Методом ПЦР – ДНК/РНК возбудителей клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, анaplазмоза

При положительном результате исследования необходимо немедленно обратиться к врачу.

При обнаружении в исследуемом клеще РНК вируса клещевого энцефалита проводится экстренная профилактика.

При обнаружении РНК возбудителей иксодовых боррелиозов, ДНК возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека назначается врачом-инфекционистом не позднее пятого дня после присасывания клеща.

Далеко не всегда укус инфицированного клеща влечёт за собой заболевание человека, тем не менее, наличие специфических антител классов IgM и IgG не ранее, чем через 2 недели с момента укуса, а в сыворотке крови человека на наличие специфических антител классов IgM и IgG не ранее 4 недель.

Порядок приема клеща на исследование:

- извлеченного клеща необходимо сохранить в максимально неповрежденном состоянии, поместив его в стерильные баночки (флаканы), плотно закрывающихся, с широким горлышком), с кусочком влажной ваты
- привезти контейнер с клещом по адресу, где находится лаборатория (при обращении не позднее 7 дней с момента укуса)

