
О профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800



В туристических
следует
в стога

Если вас не было в доме или
на даче даже одну неделю
необходимо в первую очередь

18.05.2021 г.

Роспотребнадзор напоминает, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)

Показатель заболеваемости ГЛПС в 2020 году в Российской Федерации (2,62 на 100 тыс. населения) по сравнению с 2019 годом (1,97) увеличился. В 2020 году в ряде регионов, в том числе в Приволжском федеральном округе, отмечены случаи регистрации случаев заболевания в 2020 г., даже в эндемичных по ГЛПС регионах, стала

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация по ГЛПС наблюдалась в Удмуртской Республике (показатель заболеваемости в этом регионе). Возбудителями ГЛПС на европейской территории, как правило, являются

В январе-апреле 2021 года зарегистрировано 233 случая ГЛПС, показатель заболеваемости составил 2,62 на 100 тыс. населения.

Источниками хантавирусов являются мелкие млекопитающие, в основном грызуны. Основными условиями для его проникновения в организм человека, с последующей диссеминацией через кровь являются

Человек эпидемиологической опасности не представляет, передача возбудителя от человека к человеку не происходит.

Инкубационный период при ГЛПС составляет от 4 до 49 дней (в среднем 2-3 недели).

Восприимчивость к ГЛПС всеобщая. Заболевают чаще мужчины (70-90% больных) наиболее восприимчивы к ГЛПС

Природные очаги ГЛПС существуют в лиственных и смешанных лесах, лесостепных ландшафтах. В этих условиях геморрагическая лихорадка протекает без клинических проявлений как хроническая инфекция. Благоприятные для размножения грызунов, приводящие к росту их численности.

Чаще всего человек заражается при вдыхании пыли, зараженной вирусом ГЛПС, при посещении лесов, охоте, работе в лесостепных ландшафтах.

Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 38-40°, озноба, резких головных болей, которые резко уменьшается, в тяжелых случаях развивается анурия - полное прекращение выделения мочи.

В целях предупреждения заболевания необходимо обеспечить проведение комплекса профилактических мероприятий:

- При посещении леса необходимо строго соблюдать личную гигиену посуду и пищу нельзя употреблять в пищу сырые продукты животного происхождения.
- В туристических походах для ночлега следует выбирать сухие, не заросшие кустарником и травой места.
- Если вас не было в доме или на даче даже одну неделю, необходимо в первую очередь провести уборку помещений, особенно подсобных помещений.
- При уборке дачных, подсобных помещений, гаражей, погребов рекомендуется надевать перчатки, маску и др.
- Не захламлять жилые и подсобные помещения, дворовые участки, особенно частных домов.
- Исключить возможность проникновения грызунов в жилые помещения и хозяйственные постройки.

